

че о сереще de kontaktъл аерълтѣ; дар индатъ че se ia олеїл, саѣ къ se бате ліквоареа къ о вакетъ, se принде пъмай декитъ in таѣ кристалитъ.

Sulfatul de sodъ, disolvindse in апъ, ші маї къ seamъ in acidul chlorhydricу, продаче yn ՚prig konsideравіл.

Къ асеменеа amestekътъ se noate dobîndi гиацъ къ пъдіпъ келтвіалъ.

Пропорциile че іsвătesk маї vine sint ачестеа:


Sulfatу de sodъ . . . . .	1500 gr.
Acidу chlorhydricу . . . . .	1200

Операдіеа se face in tp'yn апарат че se компоне de yn чліндръ скорбърос, destinat a прими amestekътъра ре-спріцерантъ. Ачест чліндръ este інкапсулат de o інвъ-літъръ къ yn fand indoit, квпринзінд апъ че debine yn члі-ліндръ de гиацъ in тімплъ операдіе; афаръ de ачестеа se квфанде in amestekътъра респріцерантъ о кътие металікъ плінъ de апъ че se префаче in гиацъ. Токмаі dппъ маї тълте операдії съквесибе se добіндеск кіте-ва кілограме de гиацъ. Гиада препаратъ прін ачест тіжлок винеaproape de 40 центіме кілогратмъ.

Препараціе a sulfatului i de sodъ. — Ачестъ sape esistъ in disoluqie in оаре-каре ане de isvor, ші se depnne прін евапорадіе in stape de sulfatъ indoit de sodъ ші de calce че se кіамъ schlotу

Schlotul, traktat прін апъ, se deskomponе in sulfatъ de calce пъдіп солబіл, ші in sulfatъ de sodъ че ръмнне in апъ ші поате кристаліса.

Sulfatul de sodъ se препаръ обичнійт deskomponind sapea mapinъ прін acidul sulficу:



Deskomposiціеа сърі mapine прін acidul sulficу se face in квантитате mapе in чліндри de fontъ че компонікъ къ о sepie de кътий къ апъ in каре se kondensъ acidul chlorhydricу.

In челе маї тълте фаріче de челе mapі, реакціеа acidulu i sulficу асвпра сърі mapine se оперъ intp'yn квп-топ къ реверверікъ, ші adesea se face in ачелаш квптор soda врятъ ші sulfatul de sodъ. Квпторъл este indoit,