



Fig. 4. — Coupe verticale et transversale de la région temporale gauche passant vers le milieu de l'arcade zygomatique.

- |  |  |
|--|--|
| A, peau.   | J, coupe du masséter.  |
| BB', tissu cellulo-adipeux sous-cutané.  | K, apophyse coronoïde du maxillaire inférieur.                                   |
| CC, aponévrose épicroanienne.  | L, muscle temporal.  |
| DD', couche celluleuse sous-aponévrotique.   | M, dure-mère crânienne.  |
| EE'E'', périoste de la voûte, de la fosse temporale et de la base du crâne.          | O, coupe de l'artère méningée moyenne comprise dans l'épaisseur de la dure-mère. |
| F, aponévrose temporale.   | P, coupe du tronc de la maxillaire interne dans la fosse zygomatique.            |
| F', feuillet externe de cette aponévrose.  | Q, artère temporale profonde.  |
| F'', feuillet interne.   | R, artère temporale moyenne.   |
| G, couche de graisse interposée entre les deux feuillets de l'aponévrose temporale.  | S, artère temporale superficielle.   |
| H, couche de graisse placée en dedans du feuillet interne de l'aponévrose temporale. | T, coupe de la paroi osseuse.  |
| I, coupe de l'arcade zygomatique.  | T', apophyse ptérygoïde.   |
|  | U, fosse zygomatique.  |