

diagnostic obscur, on peut commencer par faire une compression directe sur la plaie et une compression indirecte à distance sur le trajet des artères radiale et cubitale. Si la compression échoue, on liera les deux bouts dans la plaie. La pratique est difficile, sans doute, si la plaie est en suppuration et, surtout, si l'hémorragie vient de l'arcade profonde, mais c'est la seule conduite à tenir pour sauver la vie du blessé. On pourrait encore essayer de placer une pince à forcipressure, qui serait laissée en place pendant vingt-quatre ou quarante-huit heures.

Branche profonde du nerf cubital.

— Nous avons vu le nerf cubital se diviser en deux branches au niveau de la gouttière du pisiforme. L'une de ces branches accompagne le tronc de l'artère cubitale et reste sous-aponévrotique ; c'est elle qui fournit une partie des nerfs collatéraux palmaires ; l'autre branche s'enfonce profondément sous le court fléchisseur du petit doigt, décrit au-devant des métacarpiens et en arrière de l'aponévrose une courbe à concavité supérieure parallèle à celle de l'arcade palmaire profonde, dont elle partage les rapports, et se termine dans l'adducteur du pouce. Elle fournit, en outre, des filets aux muscles de l'éminence hypothénar, aux deux lombricaux internes et à tous les muscles interosseux.

Muscles interosseux (Voy. fig. 184 et 189). — Je n'ai pas à m'occuper ici des




Fig. 190. — *Système artériel du membre supérieur envisagé au point de vue de ses anastomoses.*

- A, anastomoses artérielles sur le bord externe du coude.
 A', anastomoses artérielles sur le bord interne du coude.
 A'', anastomoses artérielles à la partie inférieure de l'avant-bras.
 AC, artère cubitale.
 AH, artère humérale.
 AI, artère interosseuse antérieure.
 APP, arcade palmaire profonde.
 APS, arcade palmaire superficielle.
 AR, artère radiale.
 ARP, artère radio-palmaire.
 CI, artère collatérale interne.
 HP, H'P, artère humérale profonde à son origine et après avoir traversé la gouttière de torsion de l'humérus.
 RC^a, artère récurrente cubitale antérieure.
 RR^a, artère récurrente radiale antérieure.

muscles interosseux au point de vue descriptif. Je me contenterai de dire qu'ils