

remonte peu à peu, à mesure que les membres inférieurs se développent ; chez l'adulte, il est situé notablement au-dessus de la partie moyenne du corps (1).

La région de l'ombilic présente une face cutanée et une face péritonéale. La première est remarquable par la présence de la cicatrice ombilicale ; la seconde par l'existence de quatre cordons qui en partent. L'un de ces cordons se porte en haut, en arrière et à droite, c'est la veine ombilicale ; les trois autres se dirigent en bas : l'un médian et vertical, l'ouraque ; les deux autres latéraux et obliques, les artères ombilicales.

Étudions successivement et d'avant en arrière les diverses parties dont se compose la région, à savoir :

La peau ;

L'anneau ombilical, son pourtour fibreux, ses rapports avec les vaisseaux ombilicaux ;

Le péritoine.

Le schéma représenté figure 213 en donne une idée suffisamment exacte.

(1) Il existe à cet égard des variétés individuelles très nombreuses, et qui sont en rapport avec la différence de longueur des membres inférieurs. Toutefois, l'ombilic est situé sensiblement au-dessus du milieu du corps chez l'adulte ; la moyenne de la taille chez 13 sujets étant de 1^m,67, dont la moitié est de 83^{cm},5, la distance moyenne de l'ombilic au sommet de la tête a été de 64 centimètres, c'est-à-dire que l'ombilic siègeait à 20 centimètres au-dessus du milieu du corps. — Voici les chiffres pour chaque sujet :

Taille des sujets.	Distance du sommet de la tête à l'ombilic.
1 ^m ,69.....	0,65 cent.
1 ^m ,59.....	0,61
1 ^m ,71.....	0,66
1 ^m ,74.....	0,67
1 ^m ,56.....	0,61
1 ^m ,67.....	0,65
1 ^m ,76.....	0,68 1/2
1 ^m ,68.....	0,62
1 ^m ,69.....	0,62 1/2
1 ^m ,63.....	0,65
1 ^m ,57.....	0,62
1 ^m ,67.....	0,67
1 ^m ,65.....	0,66 1/2
Moyenne..... 1 ^m ,67	Moyenne..... 0,64

La situation précise de l'ombilic par rapport à la paroi abdominale présente également des variétés individuelles. On peut dire cependant, d'une manière générale, qu'il siège à peu près à égale distance du sommet de l'appendice xiphoïde et du bord supérieur de la symphyse pubienne. — Voici quelques mensurations :

Distance du sommet de l'appendice xiphoïde au bord supérieur de la symphyse pubienne.	Distance du sommet de l'appendice xiphoïde à l'ombilic.
29 cent.....	14 cent.
30	15
27	14
29	14 1/2
27	12
23	11
24	11 1/2
33	16
27 1/2	14
39	18