

PREMIÈRE PARTIE

SQUELETTE DU BASSIN

CHAPITRE I^{er}

Os et articulations.

Le bassin forme une ceinture osseuse, incomplète en haut, complète en bas, composée de quatre os : les deux os iliaques, le sacrum et le coccyx.

Os iliaque. — L'os iliaque est un os plat, qui se compose de deux parties réunies entre elles par une partie rétrécie à laquelle correspond la cavité cotyloïde ; l'une de ces parties, *partie iliaque*, est supérieure, aplatie de dehors en dedans, et constitue les fosses iliaques interne et externe. Elle est extrêmement mince à son centre qui est parfois transparent, et l'on conçoit qu'un choc la brise facilement. Le muscle iliaque en dedans, les muscles fessiers en dehors, s'insèrent à toute la surface osseuse, en sorte que les fragments sont maintenus et n'ont pas de tendance au déplacement. J'ai déjà dit qu'on avait trépané cette portion d'os pour donner issue à des abcès enfermés dans la fosse iliaque interne.

L'autre partie, *ischio-pubienne*, est inférieure. Elle forme une sorte d'anneau, circonscrivant un large orifice comblé à l'état frais par une membrane fibreuse : c'est le trou obturateur ou sous-pubien. Cette partie est l'une des plus exposées aux fractures, ainsi que je le montrerai plus loin.

Je n'ai pas à présenter ici une description de l'os iliaque ; je désire seulement parler de son développement, qui ne peut trouver place à propos de chaque région en particulier, et dont l'étude assez compliquée intéresse vivement le chirurgien.

L'os iliaque se développe par trois points d'ossification primitifs et huit points d'ossification complémentaires.

Des trois points primitifs, l'un est supérieur, l'autre inférieur, et le troisième antérieur. Chacun constitue un os séparé ; ces trois os ont reçu les noms d'*ilium*, d'*ischion* et de *pubis*.

Le premier, ou *ilium*, apparaît du cinquantième au soixantième jour de la vie intra-utérine ; le second, ou *ischion*, au commencement du quatrième mois, et le troisième, ou *pubis*, un peu plus tard. Ils convergent tous les trois vers la cavité cotyloïde, et interceptent au fond de cette cavité une portion de cartilage qui a la forme d'un Y dont la grande branche se dirige en bas. Dans ce cartilage apparaissent, vers l'âge de treize à quinze ans, trois points osseux com-