

à l'aide d'une sonde à demeure maintenue pendant plusieurs jours, ou, mieux, avec quelques séances de bougies Béniqué.

La présence du lobe moyen, formant valvule au niveau du col, occasionne la *dysurie prostatique* des vieillards. J'ai déjà fait observer plus haut que si, à cette disposition anatomique, s'ajoute un certain degré de paralysie de la vessie, il survient une rétention complète d'urine, sous l'influence d'une cause légère : un refroidissement, un excès de boisson.

STRUCTURE DU COL DE LA VESSIE.

Le col de la vessie se compose d'une muqueuse, d'un sphincter, de vaisseaux et de nerfs.

Muqueuse. — Anatomiquement, elle diffère peu de la muqueuse du corps, mais elle en diffère profondément au point de vue pathologique. Très mince et d'un blanc rosé, elle se distingue de la muqueuse du corps par l'existence d'un certain nombre de plis radiés (fig. 255) qui partent du verumontanum, et sont désignés, pour cette raison, sous le nom de *freins du verumontanum*. Ces plis sont comparables à ceux qui existent au pourtour de l'anus. De ce rapprochement anatomique entre les deux régions est résulté naturellement un rapprochement pathologique. Entre les plis radiés de l'anus, on observe fréquemment des fissures dont quelques-unes donnent naissance à une contracture très douloureuse du sphincter ; on s'est demandé depuis longtemps si certaines contractures douloureuses du col vésical ne reconnaîtraient pas la même cause. Malheureusement, il est difficile de le démontrer, mais cette opinion me paraît vraisemblable et, dans tous les cas, rend bien compte des phénomènes cliniques.

Du reste, que ce soit une fissure de la muqueuse ou bien une simple inflammation, on observe dans les cas de cystite du col de la vessie un ensemble de symptômes nettement tranchés, et qui diffèrent de ceux provoqués par la cystite du corps. Il en existe trois principaux : envies fréquentes d'uriner, douleur plus ou moins vive à la fin de la miction, besoin d'uriner impérieux dès qu'il se fait sentir. Les envies d'uriner se succèdent parfois si rapidement que les malades paraissent atteints d'une incontinence, mais c'est une incontinence par excès et non par défaut. J'ai vu une femme, atteinte d'une cystite du col, obligée de se tenir constamment sur une chaise percée, avec un bassin placé sous elle, comme une gâteuse, tant les mictions étaient rapprochées. Les malades rendent parfois, à la fin de la miction, quelques gouttes de sang, ce qui serait favorable à l'hypothèse d'une fissure occupant l'un des plis radiés.

La cystite du col de la vessie reconnaît souvent pour cause une ancienne blennorrhagie, mais elle peut se développer sous l'influence du froid, surtout du froid humide. Civiale la considérait comme une simple névralgie. Quelle que soit la cause, il faut savoir qu'elle constitue une affection rebelle, parfois désespérante, et pour le malade et pour le chirurgien. Après avoir épuisé en vain toutes les ressources du traitement médical, j'ai souvent obtenu des résultats remarquables et rapides par le passage de bougies Béniqué, de plus en plus volumineuses, de façon à pratiquer une sorte de massage du col. La cautérisation avec le nitrate d'argent réussit également dans certains cas.

Pour pratiquer cette dernière opération, je me sers du porte-caustique de