

pillomes à se reproduire, puisque, chez cette malade, ils sont revenus même après la cautérisation au fer rouge.

Comme tous les chirurgiens, je suis d'avis que ce dernier moyen doit être employé avec prudence, car il pourrait en résulter un rétrécissement. L'excision avec les ciseaux, l'abrasion avec une curette et la cautérisation avec le nitrate d'argent sont les moyens qu'il convient, en général, de mettre d'abord en usage.

Si, après l'opération et l'extirpation des polypes, la contracture douloureuse du col persistait, on dilaterait le sphincter en suivant le procédé que j'ai indiqué plus haut.

Les deux tuniques de l'urètre sont séparées l'une de l'autre par une couche assez lâche de tissu conjonctif, de telle sorte que la muqueuse glisse facilement sur la musculuse ; il en peut même résulter, surtout chez les petites filles, un prolapsus de la muqueuse par le méat urinaire. Dans cette couche celluleuse existe un riche plexus veineux, qui donne parfois à la surface interne de l'urètre une couleur rougeâtre.

CHAPITRE III

Vulve.

La *vulve* n'est pas seulement un orifice. On doit entendre sous ce nom l'ensemble des organes génitaux externes de la femme situés au-dessous de l'hymen ou des caroncules myrtiformes. C'est un espace limité en bas par les grandes lèvres et en haut par l'hymen.

des tumeurs enlevées. Il a examiné la première tumeur enlevée le 29 janvier et celle enlevée le 8 juin.

Je vais transcrire textuellement les notes qu'il a bien voulu me remettre. Est-on fixé aujourd'hui ?

Note du 29 janvier. — « La petite tumeur est mise dans l'alcool absolu et, après durcissement, divisée en tranches minces faites suivant la direction de la tumeur. Elles sont placées dans du carmin neutre pendant une minute, lavées dans l'eau distillée et étudiées dans glycérine 100, acide formique 1. Ces préparations sont triangulaires, allongées ; le sommet correspond à la partie libre de la tumeur et la base à son point d'implantation. A un faible grossissement de 30 diamètres, on voit à la périphérie une couche épithéliale colorée en rose épaisse et sinueuse, qui limite des papilles de formes variées. Le corps de ces papilles et le centre de la tumeur, avec laquelle elles se confondent par leur base, sont constitués par du tissu muqueux. Avec un grossissement de 400 diamètres, l'épithélium pavimenteux stratifié est disposé en couches lamelleuses à la surface et au sommet de la tumeur, tandis que vers la partie moyenne et le point d'implantation, au lieu d'être lamelleuses, elles sont vésiculeuses et remplies de matière muqueuse. Le tissu muqueux des papilles et le centre de la tumeur contiennent des cellules plates, des cellules lymphatiques et des vaisseaux coupés en travers et en long, complètement organisés vers le sommet de la tumeur, et embryonnaires à la base. En résumé, cette tumeur est un *polype muqueux papillaire* dont le développement se fait surtout au point d'implantation. Il est probable que l'irritation qui produit ce développement actif existe aussi dans la muqueuse. »

Examen du 8 juin. — « Le polype est constitué par un stroma fibreux, riche en cellules embryonnaires et en vaisseaux sanguins. Il possède à sa surface des papilles de formes et d'étendue variables, dont quelques-unes sont volumineuses. Ces papilles sont recouvertes d'un épithélium pavimenteux. »

Cette observation a été faite par M. Ranvier sur la coupe transversale, après imbibition dans l'alcool et coloration au carmin.