

l'anus, le sommet se prolonge sur la verge; elle est donc spéciale à la portion génito-urinaire du périnée. Sur les côtés, cette aponévrose se fixe à la lèvre




Fig. 276. — Région du périnée chez l'homme.

- | | |
|---|---|
| AC, aponévrose crurale. | IA, insertion de l'aponévrose superficielle à la lèvre externe de la branche ischio-pubienne. |
| AM, aponévrose moyenne du périnée ou ligament de Carcassonne. | IC, muscle ischio-caverneux. |
| AS, aponévrose superficielle du périnée. Elle a été détachée en avant et en haut, et rabattue en bas et en arrière au-devant de l'anus. | MH, muscle de Houston (portion antérieure du muscle bulbo-caverneux). |
| BC, muscle bulbo-caverneux. | P, peau. |
| CC, corps caverneux. | RA, releveur de l'anus. |
| G, couche graisseuse sous-cutanée. | TB, artère transverse du bulbe. |
| GF, muscle grand fessier. | TP, muscle transverse profond ou de Guthrie. |
| HI, artère honteuse interne. | TS, muscle transverse superficiel du périnée. |

antérieure de la branche ascendante de l'ischion et descendante du pubis (IA, fig. 276). En arrière, elle se réfléchit au niveau du bord postérieur du muscle transverse superficiel pour se continuer avec l'aponévrose moyenne, que l'on aperçoit entre les deux muscles bulbo- et ischio-caverneux (AM, fig. 276). En