

ты: 7 пѣти по 4 стотины, правять 28 стотины, и 3 стот., задрѣяны-ты на умъ, правять 31 стотинѣ и пишемъ послѣдне-то число цѣло подъ стотины-ты, та излиза произведение 3192.

При умноженіе многозначно число на однозначно, трѣбва да си прѣдставляемы множимо-то число разложено на единицы, десятицы и стотины и пр. дагы помножимъ едно по едно на множителя и чѣстны-ты произведенія да съберемъ. Нѣ за скратено дѣйствіе трѣбва да ся стараемъ да правимъ свѣрѣменно послѣдовательно-то умноженіе и събираніе, както направихмы въ изясненіе-то за тоя примѣръ. А за още покѣсо свѣршваніе дѣйствіе-то казвать просто: 7 пѣти по 6=42, 2 пишемъ, 4 на умъ; 7 пѣти по 5=35, и 4=39, 9 пишемъ, а 3 на умъ; 7 пѣти по 4=28, и 3=31, пишемъ цѣло това число и излиза 3192.

III. *Кога множимо-то число състои отъ едиѣ значущѣ цифрѣ (т. е. отъ единицѣ отъ по-горенъ рядѣ), съпровожденѣ отъ нѣколко нулы, а множитель-тѣ само отъ едиѣ цифрѣ, то нулы-ты оставямы, като пезначущы никакво число, а умножяемы само цифрѣ-тѣ на множимо-то и въ произведение-то отдѣсно пишемъ толкова нулы, колко-то ы има въ множимо-то.*

Напр. да ся умножять 500 на 3.

$$\begin{array}{r} 500 \text{ защо-то} \\ \times 3 \\ \hline 1500 \end{array} \quad + \quad \begin{array}{l} 500 \\ 500 \\ 500 \\ \hline 1500 = 500 \times 3 \end{array}$$

като писахмы множителя подъ множимо-то и теглихмы чъртѣ, умножихмы 5 стотины на 3, та найдохмы произведение 15 стотины, кое-то писахмы подъ чъртѣ-тѣ и послѣ му приписахмы двѣ нулы, за да показва 15 стотины =1500: защо-то да умножимъ 500 на 3 ще рѣче да найдемъ сбора ка $500+500+500=1500$.

IV. *Ако ли въ множимо-то число въ нѣкои рядове ся намирають нулы, т. е. не ся намирають въ него единицы, или десятицы, или стотины, или хыляды и пр. то единицы-ты отъ тыя рядове можть да ся не получаютъ и въ произведе-*