

ся нарича просто, защо-то неизвестният членъ ся определява само отъ една съразмърност. Тоя неизвестенъ членъ ся забележва съ буквъ u или x или u .

Търсене-то на четвъртий съразмъренъ членъ ся основава на това свойство отъ равночестната съразмърност, гдѣ-то въ нея произведеніе отъ крайни-ты членове е равно съ произведеніе отъ срѣдни-ты.

Неизвестният краенъ членъ въ съразмърностъ ся намира, като ся умножатъ срѣдни-ти членопове и произведеніе-то ся раздълъ на друтий краенъ; а неизвестният срѣденъ членъ ся намира, като ся умножатъ крайни-ти и раздълъ ся на друтий срѣденъ членъ. Напримѣръ, въ съразмърностъ

$$10 : 5 = 8 : x$$

неизвестният краенъ членъ x ще ся найде $x = \frac{5 \times 8}{10} = 4$.

Така, спорядъ свойство-то на съразмърностъ, трѣбва да бѫде $10 \times x = 5 \times 8$; а ако $10x$ сѫ равни съ 5×8 , то едно x е равно съ десетж-тѫ чистъ отъ произведеніе 5×8 , или $x = \frac{5 \times 8}{20}$, слѣдов. $10 : 5 = 8 : 4$.

Въ съразмърностъ $3 : 9 = x : 21$

$$x = \frac{3 \times 21}{9} = 7, \text{ слѣдователно } 3 : 9 = 7 : 21.$$

168. По просто тройно правило ся решаватъ всички задавки, гдѣ-то известна-та величина ся определява отъ това условіе, че нейно-то чистно отношение къмъ даденж-тѫ величини отъ сѫщия родъ трѣбва да бѫде равно на отношението между други-ты двѣ дадени величины. Такъва задавка ще ся реши, ако можемъ състави правило съразмърност-тѫ отъ три-тѣ дадени количества и отъ четвърто-то неизвестно, и послѣ да найдемъ тоя неизвестенъ членъ.

169. Съразмърностъ ся съставлява така: въ всяко пытаніе отъ такъвъ родъ намиратъ ся два именовани числа, еднородни помежду си, и два други