

Пълното използване на меласата за храна на добитъка косвено ще подпомогне нашето лозарство, защото за производството на спирт ще могат да се използват болните и развалени вина, които тожат днес на пазаря. По този начин биха се извадили от винения пазар 20—25 милиона литри вино.

Слънчогледовата култура от година на година се увеличава. Със увеличение на производството расте и количеството на отпадъците от тази култура — пититъ. Ако стопаните разполагаха със сламоръзачки за раздробяването им, те щяха да разполагат **със нови 120—150,000 тона груб фураж, който има хранителна стойност колкото сламата, но се яде по-апетитно от нея.** Сега пититът от слънчогледа се изхвърля на торището.

От 1905 год. насам в Франция за храна на приживните животни се използват **лозовите пръчки и листа.** След бране на гроздето последните се изрѣзват на височина да не се прѣчи на правилната рѣзидба през пролѣтта и след това се раздробяват със специални рѣзачки. От 1 декар се **получава около 400 кгр. маса, която има хранителна стойност колкото 220—250 кгр. добро ливадно сѣно,** т. е. толкова, колкото дават нашите естествени ливади сега. Ако ний бихме имали механизирани рѣзачки и удобства за силажиране, у нас биха могли да се получат, **при 1,000,000 дек. лозя, около 400,000 тона друг вид груб фураж за приживните животни и би се запълнила нуждата от такъв в сухите лозарски райони.**

Грамадни количества груб фураж биха се получили още от **копривата, бобовата и соева слама, лещата, стеблата и листата от дини, тикви, пъпеши и други бурени и грубостеблени треви,** каквито изобилствуват по склонове и пустеющи мѣста. Тѣзи отпадъци и непригодни за използване храни могат да станат такива, само след като се подхвърлят на механическа обработка — изрѣзване.

Според изчисленията на горските власти в семени години нашите гори дават приблизително **150—200,000 тона буков и дъбов жълдъ, конски кестен и др.** От тѣзи храни се използва съвсем незначителна част и то само от свините. След предварителна обработка — изпичане, олющане и смилане — сѣжитъ могат да станат концентрирани храни, богати на бѣлткъ и въглехидрати и да запълнят нуждата от такива за бедните планински райони, като се използват за храна на всички видове домашни животни.

Без да разполагаме съ точни данни може да се приеме достоверно, че в всѣко земеделско домакинство ежегодно остават като отпадъци от храната **10—15 кгр.**