

окръжи, въ 40 отъ тѣхъ е разпространена тая болѣсть (вижъ dott. G. Pieraccini въ Cabrini, op. cit., p. 33).

На инфективитѣ отъ тая болѣсть се прѣпоръчва още при първо забѣлѣзване на поблѣдняване и слабостъ да прибѣгватъ къмъ медицинска помощъ за да прѣварятъ размножаването на червейнитѣ яйца. (Агенти на болѣстѣта сж кацналитѣ тукъ-тамъ на откритѣ въздухъ човѣшки остатъци, съ какъвто начинъ на ватеръ-клозетирание могатъ да се похвалятъ най-вече работницитѣ отъ горнитѣ занятия).

Еднокръвния братъ на тоя червей е разпространения въ Америка тѣ нарѣченъ *anchilostoma Dubini* или *Americana* или още *Stiles*, донесенъ въ Европа отъ щатитѣ Виржиния, Каролина, Жеоржиа, Флорида, отъ Порто Рико, отъ Бразилия и т. н., гдѣто страдатъ тѣ много мѣстнитѣ работници отъ него. На италианскитѣ емигранти се прѣпоръчва да не приематъ работа въ американскитѣ пещи, минь, въ прокопаване на галерии и т. н. За избѣгване на заразата изисква се прѣди всичко *чистота*; прѣзъ врѣме на работене работника не трѣбва да допира рѣцѣтъ си до устата и винаги да ги мие прѣди да яде, да не работи босъ, да не пие вода отъ незакритъ сждъ и т. н.

Колкото за останалитѣ болѣсти, като *остиката* и *сифилиса*, колкото и да сж днесъ безотечествени, условията при които живѣятъ и се трупатъ наедно работницитѣ въ Америка, помагатъ за интензивното имъ развиване и разпространяване повече тамъ, отколкото въ роднитѣ огнища. Особенно сифилиса, непознатъ за селенитѣ въ родината имъ, прѣди всичко поради подържания тамъ отъ извѣстни традиции консерватизмъ въ еротическитѣ отношения, се принася много примѣрно въ дѣйствиени отъ къмъ тая културна ваксинация кжтове, и трови цѣли поколения.