

№	Мѣстона- хождение.	Топлина на водата *)	Химически свойства на водата.	Отъ какъвъ камъкъ извиратъ.	ЗАБѢЛЖКИ.
1	Хиссарски.	35°P—47°P	(Вижьдъ страница 11).	Гранитъ-гнейсъ.	(Вижьдъ страница 12—14).
2	Сръдецъ.	31°—38°P (ок. 35°P Бѹе)	Сѣроводородъ.	Дилувални наноси.	Бассейна прѣдставл. полигонъ отъ 27 стѣнки въ диаметръ
3	Кюстендилъ.	До 60°P	Симпуро-алкалически	Гранитъ-гнейсъ.	8 извора. Споредъ Бѹе 38°P, 55°P (из- вира до джамията) 54° (извора въ градина); 47°, 54—55°P. — виждъ страница 16.
4	Сапарево.	44—45°P	Сѣрна.	Гнейсъ.	Въ долината на Дупница (между Самоковъ и Дупница).
5	Врана.	Ок. 48°P	—	Гнейсъ.	Близу до границата.
6	Карловски.	Ок. 40°P	(Вижьдъ страница 17).	Изъ алувиални наноси	(Вижьдъ страница 18).
7	Крастовски.	Ок. 47°—50°P	Единъ изворъ съдържа малко сѣроводородъ.	Гранитъ-гнейсъ.	Два бассейна (Вижьдъ страница 18—19).
8	Стрѣлченски.	—	Съдържатъ сѣро- водородъ.	—	Лѣкуватъ ревматизмъ, скро- фули и пр.
9	Панагюрски. (с. Бата).	Ок. 35—38°P	—	Червени мергелни плоч- ки на флишъ-форм.	Въ извора има черенъ пѣськъ, който изнася водата изъ земнитъ дѣлабочини.
10	Казанижски.	—	Съдържатъ сѣро- водородъ.	Алувиални наноси.	Прѣди двѣ год. ослабнали тѣзи извори.
11	Павелски.	—	—	Гранитъ-гнейсъ.	На близу се намиратъ угаснали волкани.

*) До колкото е извѣстна.