

истокъ прѣзъ Источний Балканъ, Южна Русия, Персия както и прѣзъ Марокко, Египетъ, Арабия дори до Индия.

Особенно впечатление ни докарва и това, че въ околността на с. Сотиря, намираме окаменѣли щипци отъ единъ *морски ракъ*.

Нъ, защо не намираме цѣлий ракъ окаменѣлъ? Това лесно ще си изясниме, ако прѣдварително изучимъ единъ подобенъ ракъ, който до днешно врѣме живѣе въ Срѣдиземно море. Тѣлото му е меко, ципесто, и само щипцитѣ му сж твърди. Такъвъ е почти билъ и тойзи ракъ, който, въ врѣме на нулуитеното море, е живѣлъ въ околността на с. Сотиря.

Мекото му тѣло се разрушило, а твърдитѣ му щипци окаменѣли.

Друго явление въ камънитѣ до с. Сотиря е, че се намира въ тѣхъ окаменѣла *кривакообразна мида* (Pipna), за която неопитнитѣ прѣдполагатъ, че била „рибена опашка“. Ако сравнимъ тѣзи окаменелина съ до сега живущата въ Срѣдиземно море, кривакообразна мида, ще видимъ, че принадлежатъ почти къмъ единъ и сщий видъ. Тя прилича на кривакъ; черупкитѣ ѝ сж еднакво тънки и съ острий си връхъ бива заровена въ пѣсъкътъ.

Твърдѣ любопитни окаменѣлини въ околността на г. Сливенъ и с. Сотиря сж и *морскитѣ таралежи*. Морскитѣ таралежи, които до сега живѣятъ въ Срѣдиземно Море, сж като кълба валчести животни, цѣли покрити съ подвижни бодили; горний пластъ на тѣлото имъ се състои отъ многобройни правилни плочици (дъсчици), които иматъ многобройни малки дупчици: по плочкитѣ има наредени брадавички, на които сж прикрѣпени подвижнитѣ бодли.

Морскитѣ таралежи живѣли и изъ едноврѣмешното сливенско море; особенно тѣзи видове на които тѣлото било покрито съ топчести иглици, (нарѣчени окаменѣли „желжди“ Cidaris). Грамадно количество окаменелини, по-вечето морски миди, охлюви, таралежи, корали и пр. се намиратъ въ околността на г. Хасково, Кърджалии, Каяджикъ, Х. Еллесъ, Чарпанъ, Котелъ, между Айтосъ и Шуменъ, Варна, Бургасъ (на сѣверъ) и пр. Въ околността на Руссе се е намѣрилъ въ 1883 г. исполински Амонътъ. Въ околността на Котелъ, Габрово и пр. се намиратъ окаменѣли *морски лалета* (Penta-