

Хлѣбни растения.

Хлѣбнитѣ растения происхождатъ отъ отгледванието на диви трѣви, които намираме и въ днешно врѣме още по ливадитѣ и пр., както напр. дивъ ячмикъ и др. Отгледванието на тѣзи диви трѣви е захванало постъпенно отъ памтивѣка.

Отъ малкитѣ сѣменца, каквито иматъ дивитѣ трѣви, постъпенно, чрѣзъ отгледванието имъ въ оранитѣ ниви, произлизатъ по-едри сѣмена (зрънца), каквито намираме у хлѣбнитѣ растения.

Халлетъ въ Англия избралъ най-добритѣ и най-здравитѣ житни зрънца, които отгледвалъ въ приготвена, дълбоко разорана, ровка и торена орна прѣстъ и то именно едно зрънце въ пространството на една квадратна стѣпка, тѣй щото растението може да земе всичката си потрѣбна храна отъ туй мѣсто. Класътъ и зърната станали голѣми. Халлетъ повтарялъ нѣколко години този опитъ. Въ 1857 г. избралъ единъ житенъ класъ, който съдържалъ 47 зърна; отъ засѣтитѣ зърна на този класъ избралъ, слѣдъ узрѣването имъ, най-дългий класъ и той съдържалъ вече 79 зърна;

въ 1859 г. съдържали нѣкои класове по 91 зърна,		
въ 1861 г.	„	123 зърна.

Лордъ Палмерстонъ, който посѣтилъ прочутитѣ ниви на Халлета, казвалъ въ английското народно събрание, че ако би да се отгледва по този начинъ житото въ цѣла Англия, нещѣло да има нужда да се докарва въ многозаселената Англия жито отъ чуждестранство.

Обработванието на хлѣбнитѣ растения върви споредъ развитието на цивилизацията; на земята има малко мѣста, гдѣто тѣ не растѣтъ.

Нѣкои обстоятелства показватъ, че ще се появятъ въ България съ врѣме нѣкои землѣдѣлчески неприятели, които упропастяватъ земледѣлческитѣ растения. Въ околността на г. Пловдивъ прѣзъ мѣсецъ Юний 1881 г. намѣрихъ хиляди и хиляди космати бубулечки (*Rhizotrogus solstitialis*). Ларвитѣ (черви), отъ които се раждатъ „косматитѣ бубулечки“ живѣятъ въ земята и упропастяватъ коренитѣ на хлѣбнитѣ растения.