

Въ диво състояние брошътъ расте въ мала Азия, Гърция, Кавказъ и южна Европа. Отгледва се много въ Елсасъ, Унгария (Банатъ), Холландско, южна Франция и пр. Най-добрий брошъ е левантинский, който се испраща прѣзъ Смирна за въ Европа. Холландский брошъ принадлежи къмъ най-добритѣ и се распраща особено отъ г. Ротердамъ въ бѣзви съ по 5-600 килогр. Елзаский брошъ се цѣни много. Отличителенъ брошъ е южнорусский нарѣченъ „Маремма“. Въ Левантъ бержтъ коренитѣ на брошътъ слѣдъ 5-6 години.

Брошътъ съдържа една червена краска, която служи особено за вапцувание памукъ на червено; освѣнъ това употреблява се и за правение мастила.

Червената брошена боя се добива сега и искусственно „нови краски“. Раздробений брошъ се смѣсва (се подправя) съ стукани тухли и пр.

(Извѣстната македонска прѣжда, на която другочъ търговското значение бѣше много голѣмо, вапцувахъ съ тази краска.)

Синилникъ.

Въ листата на това растение се намира жълта краска, която на въздуха се промѣнява и става синя. Синилото се прѣдставлява въ търговията въ неправилни кжсове съ синь цвѣтъ; то е сухо, лесно чупително, легко и обикновенно плува надъ водата. Синилникътъ се отгледва въ Италия, Франция, Унгария и пр.

Млъчка. Бѣлий сокъ, който се намира въ това растение, служи за вапцувание на жълто.

Съ орѣховитѣ черупки вапцуватъ жълтокафяво, съ кората на осенътъ (*Fraxinus*) — синьо и пр.

Резеда (Reseda luteola).

Въ цѣла България расте въ диво състояние това растение, което по другитѣ страни, както въ Франция, Унгария и пр. сѣятъ за туй, че съдържа въ себе си една жълта краска (*luteolin*). Служи за вапцувание коприна на жълто. Най-много се цѣни французската резеда отъ Провансъ. На мѣсто резеда употреблява се за сега много кората отъ „кверцитринъ“.

Смрадлика (тетре), Rhus coriaria L.

Смрадликата се състои отъ по-младитѣ листа и клончета на „*Rhus c.*“, която се вади въ южна Европа. Изсѣхналитѣ листа и клончета на смрадликата се мелятъ и даватъ единъ зеле-