

струпка (келка); тая струпка на 22-ый день падне и на място-то ѝ стане грата, и така болесть-та ся сврьши.

Сипаничява крава не трѣбува да ся мячи съ лѣкове, а да ся остави на мира и да ся не дои доклѣ ѝ замиине. У Англія има отряденѣ наградѣ за оногова, който пръвъ бы съглядалъ и обадилъ, че нѣкоя си крава ся е шарила (сипала). Лимфа-та отъ сипаничия кравѣ ся събира отъ чирки-ты ѝ, та ся дръжи готова за присажданіе. Едно врѣмѧ тѣлѣ лимфа на мазвахѣ на пера отъ слоновѣ кость или отъ стѣкло, па кога да болясътъ чловѣка, надупчяхѣ му на рѣкѣ, и откакъ понамокряхѣ тыя пера за да ся размые лимфа-та, натрѣкахѣ и намажяхѣ надупченото място, каквото да влѣзе лимфа-та въ кръвь-тѣ. Сега бола (мая) прибирайтъ и дръжътъ у особены стѣклени цѣвчицы, затыкнѣтъ добрѣ и на два-та края, каквото да не влиза вѣтрѣ въздухъ. Така запазенъ болъ може трая много врѣмѧ безъ да ослабне, стига да ся дръжи на студено и да ся пази отъ въздухъ, отъ киселини и отъ нишядѣръ.

Болъ-тъ, както е вече доказано, може да запази чловѣка отъ сипаницѣ само нѣколко години; отъ 20 години повече не може да пази; затова сега болясътъ нѣколко пѫти, по на 10 години божемъ по единаждѣ. Присадѣ-тъ не ослабва даже и кога ся присади отъ чловѣкъ на чловѣкъ, колкото щешь пѫти, стига само да ся бара съ него добрѣ.

Кога ся болясва дѣте, лѣкарь-тъ бодне по лакътя, та направи три дупчицы, па намаже съ перо-то или излѣе изъ стѣклени-тѣ цѣвчици бола, чо е до несъль, или го земе отъ друго болясано дѣте. А отъ това малко нѣчто присадѣ чо става? Дѣте-то