

ся поболи като отъ сипаницѣ, полиши ся, земе да гори и по набодены-ты мѣста ся явява това сѣщо-то, което става и отъ сипаницѣ, сир. на 7-ый день подпухнѣтъ, на 9-ый день избѣжѣтъ прыщицы, които послѣ гноясать, пукнѣтъ ся и засѣхнѣтъ, та ся покрывѣтъ съ чешюлки, които между 15-ый и 20-ый день опадать, та оставять по три звѣздаты грапы.

На болясано не бива да ся туря ничто на ранѣ-тѣ, а да му ся пази отъ прахъ и смрадъ и отъ студъ; за това болясано дѣте не бива да ся кѣпе. Пóдобрѣ е и да ся обвѣе рана-та съ мягкѣ крѣпицѣ, кагвото да ся не жюли, зачтото може ся случи да ся ожюли рана-та, па да си натрѣка дѣте-то уста-та, носа и очи-ты и тогава и тѣхъ ще боляса, та може послѣ да тегли. Лѣкарѣ-тѣ особено трѣбува да внимае, та ако бы ся случило о прѣвъ пѣтъ да не хване болѣ-тѣ, да боляса и вторый пѣтъ. Болѣ-тѣ може да не хване или 1) зачтото не е было болясано както трѣбува, или 2) зачтото на дѣте-то кожа-та е дебела, корава и ягка, та не е пробилло до подкожны-ты власны жилицы; затова кога да ся боляса дѣте, трѣбува да му ся измые мѣсто-то — дѣто ще ся боляса — съ чистѣ водѣ, па да ся истрѣе и потрѣе съ вълненѣ крѣпицѣ доклѣ ся зачерви сир. да удари тамъ повече кръвь, или 3) найсѣтнѣ, зачтото присадѣ-тѣ е былѣ слабѣ; затова болѣ-тѣ всякога трѣбува да ся зима отъ узрѣлѣ, околчестѣ и прозирнѣ чиркѣ, и то въ 8-ый день, когато болясване-то е въ найдобро-то си развитіе. Еще пóсигуренѣ е болѣ-тѣ, кога ся земе направо отъ пѣпкѣ-тѣ на вымя-то на сипанчявѣ кравѣ, както ся каза пóгорѣ.

Слѣдъ всичко това може нѣкой попыта: *кога*