

у него отъ 6 до 10 чяса. За такъвъ растопъ, доста ще е да земемъ синь камыкъ, колкото единъ лещникъ, та да го растопишъ въ водѣ у единъ голѣмъ чашъ. — Добрѣ е еще, ако ланскѣ-тѣ годинѣ ти сѣ болѣли бубы-ты отъ тѣхъ болесть или отъ другѣ каквато да была, да си направишъ новы полицы и лѣсы, па одѣра и самы-ты стѣны на онѣхъ стањ, дѣто сѣ хранены лански-ты бубы, да изжюлиши и измыешъ съ ягкѣ золѣ (цѣдѣ), или съ ягкѣ растопъ отъ синь камыкъ. Тая болесть врѣлѣе повече по южны топлы мѣста, а не толко по сѣверни и по студены мѣста. Нехайство-то въ храненіе-то, натрупани-ти угрызци отъ листа, помѣсены съ всякахъ нечистотѣ, безмѣрна-та влага и горящина у стањ-тѣ, дѣто ся храни, всичко това докарва пѣмного да ся распростране тая болесть.

Вторый строй епидемія по бубы-ты ся познава по едны уканки (плескуды), които ся изсыпять по тѣло-то на бубѣ-тѣ, и затова тѣхъ болесть наричать *епидеміјъ сѣ уканки* (дамги). Тая епидемія прави найголѣмъ пакость по бубы-ты, и забѣлѣжително е, че зараза-та ѝ ся намира не само у живы-ты, нѣ и у мрѣтви бубы, па и у само-то сѣмя; зачто-то съ ягкѣ микроскопъ е сѣглядано по тѣхъ безбройно много еживоинки, облы като яйце и доста прозирны. Тыя тѣбройни животинки разѣдѣть утробѣ-тѣ на бубѣ-тѣ, нѣкога веднага, слѣдѣ првый и вторый сѣнь, а повечето слѣдѣ найдырній сѣнь. Тая болесть много прихваща; оттова, ако у сѫщѣ-тѣ стањ ся хранять и здравы бубы, то и тѣхъ ще прихване. Нѣ на тѣхъ епидеміјъ ся излиза на главѣ, ако сѣ исчупени бубы-ты отъ сѣмя, което изнамѣрихъ да вадять по единъ новъ начинъ, по който нездраво-то сѣмя