

пеперуды-ты на чяса пущать отъ себе единъ мръкъ, гнусенъ сокъ па сѫ и тромавы и лѣнивы.

9. Една женска пеперуда снасе отъ 800 до 900 яйца, отъ които ако сѫ отъ японокы бубы, 7500, ако ли сѫ отъ нашенски бубы, 5000 зърна докаждать единъ драмъ. Обыкновено ся зима, че отъ 10—до 12 драма кожюрцы излиза единъ драмъ съмъя.

10. Откакъ снесе съмъя-то, слѣдъ 3—4 дни зачыне и женска-та пеперуда, коѫто щешь махнешь на странж. Затова не трѣбува много труда: подвигни малко платно-то, па тръсни и мрътвы-ты пеперуды щѫть попадѫть долѣ самы, безъ да тя е страхъ, че ще попада и съмъя-то или живы-ты пеперуды, зачтото ти сѫ ся охванжли ягко о платно-то, а съмъя-то е съвсѣмъ прилѣпено о него.

11. При всичко това трѣбува да ся гляда, да не бѫде много горяще на пеперуды-ты, които щѫть носять съмъя; топлина-та да не бѫде по-долѣ отъ 15 и по-горѣ отъ  $18^{\circ}$  стъпни.

12. Ако си хранилъ отъ повече видове бубы, па искашь да имашь различни видове съмъя, то извади отъ всякий видъ съмъя-то отдѣлно.

13. Само отъ здраво съмъя може да ся надѣе чловекъ на добъръ рой, затова трѣбува и извадено-то съмъя да ся треби, каквото да ся отдѣли здраво-то отъ нездраво-то. Здраво-то съмъя быва синкаво-сиво, или тъмномръко, въ срѣдѣ-тѣ си малко впито, а кога ся сдроби съ ногъ-тѣ пуща чистъ сокъ. Нездраво-то съмъя е червеникаво; отъ него ся прихваща и поболѣва и здраво-то. Бѣлы-ты или жълты-ты яйченца сѫ съвсѣмъ праздны и излизатъ отъ неслѣпены бубы.

14. Съмъя-то ся измыва у хладна водѣ ( $12^{\circ}$  Р.) и при мыеніе-то ся бръка; здраво-то съмъя пада на