

ἔμβρυον, ὥσπερ εἴρηται, χωρίζων πρὸς τὸ ὑγρόν. Ὑποκάτω
 δὲ τούτου τὸ ὠχρὸν ἐν ἐτέρῳ ὑμένι περιειλημμένον, εἰς ὃ
 τείνει ὀμφαλὸς ὁ ἀπὸ τῆς καρδίας καὶ τῆς μεγάλης φλεβὸς
 φέρων, ὥστε μὴ εἶναι τὸ ἔμβρυον ἐν μηδετέρῳ τῶν ὑγρο-
 5 τήτων. (6) Περὶ δὲ τὴν εἰκοστὴν ἤδη φθέγγεται τε κινού-
 μενος ἔσωθεν, ἂν τις κινῇ διελὼν, καὶ ἤδη δασὺς γίνεται
 ὅταν δ' ὑπερβῇ τὰς εἴκοσιν, ἢ ἐκκόλαψις γίνεται τῶν ὧν.
 ἔχει δὲ τὴν κεφαλὴν ὑπὲρ τοῦ δεξιοῦ σκέλους ἐπὶ τῇ λαγόνι,
 τὴν δὲ πτέρυγα ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς· καὶ φανερὸς κατὰ τοῦτον
 10 τὸν χρόνον ὃ τε χοριοειδὴς ὑμὴν ὁ μετὰ τὸν τοῦ ὀστράκου
 ὑμένα τὸν ἔσχατον, εἰς ὃν ἔτεινεν ὁ ἕτερος τῶν ὀμφαλῶν
 (καὶ ὁ νεοττὸς ἐν τούτῳ δὴ γίνεται τότε ὅλος), καὶ ὁ ἕτερος
 ὑμὴν χοριοειδὴς ὢν, ὁ περὶ τὸ ὠχρὸν, εἰς ὃ ἔτεινεν ὁ ἕτερος
 ὀμφαλός· ἄμφω δ' ἦσθιν ἀπὸ τε τῆς καρδίας καὶ τῆς φλεβὸς
 15 τῆς μεγάλης. Ἐν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ ὁ μὲν πρὸς τὸ ἔξω
 χόριον ὀμφαλὸς τείνων ἀπολύεται τοῦ ζώου συμπεπτωκώς,
 ὁ δ' εἰς τὸ ὠχρὸν φέρων συνήρτηται τοῦ νεοττοῦ πρὸς τὸ
 ἔντερον τὸ λεπτόν, καὶ ἔσω τοῦ ὠχροῦ πολὺ ἤδη γίνεται ἐν
 τῷ νεοττῷ, καὶ ὑπόστημα ἐν τῇ κοιλίᾳ ὠχρὸν. (7) Καὶ
 20 περίττωμα δ' ἀφήσιν περὶ τὸν χρόνον τοῦτον πρὸς τὸ ἔξω
 χόριον, καὶ ἐν τῇ κοιλίᾳ ἔχει· λευκὸν δὲ καὶ τὸ ἔξω περίτ-
 τωμα, καὶ ἔσω τι ἐγγίνεται λευκόν. Τέλος δὲ τὸ ὠχρὸν αἰεὶ
 ἔλαττον γινόμενον, *καὶ* προῖδον ἀναλίσχεται πάνπαν καὶ
 ἐμπεριλαμβάνεται ἐν τῷ νεοττῷ, ὥστ' ἤδη ἐκκεκολλημένου
 25 δεκαταίου, ἂν τις ἀνασχίσῃ, ἔτι πρὸς τῷ ἐντέρῳ μικρόν
 τι τοῦ ὠχροῦ λείπεται, ἀπὸ δὲ τοῦ ὀμφαλοῦ ἀπολέλυται,
 καὶ οὐθέν γίνεται μεταξὺ, ἀλλ' ἀνήλωται πᾶν. Περὶ δὲ τὸν

7. Γίνεται, ὅταν ὑπὲρ τὰς εἴκοσιν ἢ ἐκκόλαψις γίγνηται Bk.