

лы дд (фиг. IV.) въ мехуръ в, кой-то въ най-  
долній и пайпредній край на коремъ-ть лѣжи.

д.) Черный дробъ е великъ и червеникъвъ,  
и стои исподъ прѣградж-тѣ отъ деснѣ странж  
на стомаха. На него е жльчный мехуръ, а кръвъ-  
та му дохожда изъ двѣриж-тѣ жилж, отъ коихъ-  
то той отдѣлява жльчка-та, коихъ-то послѣ изъ  
тоя неговъй мехуръ има видъ като круша, и  
капе въ тѣнко-то чръво дванацетникъ-ть, та  
така спомага за смиланіе-то на хранж-тѣ.

е.) Слезъни-та лѣжи на лѣвж-тѣ странж  
до желудокъ-ть исподъ долни-ти рѣбра; у чло-  
вѣка, тя е 6 прыста длъга и 3 широка. Тя има  
своя собственна жила и било, и извѣтрѣ състои  
отъ много малки едва на другж смѣсены жици  
и нерви, у кои-то ся изтѣняватъ и за прѣмину-  
вали въ червый дробъ приготавлявать.

Желудокъ-ть и всичко-то му устройство  
състои, като ся отваря и затваря, та смила хран-  
ж-тѣ, коихъ-то му доходи, та пита мелныи сокъ  
изъ раздробенж-тѣ хранж извлачи, а всичкий  
другий непотрѣбный остатъкъ отъ немъ чрѣзъ  
мокротиж-тѣ цѣвь на гѣзно-то чръво на вѣнь  
извръга изъ тѣло-то.

5.) Жилы друго-яче сеѧдове на человѣческо-  
то тѣло сѫ шупли, или каналы, у кои-то ся на-  
мирать различны течности; И. пр. кръвь, вода,  
млѣко и пр. Оттова сѫ и тѣи дѣлатъ на кръвны,  
водны и млѣчны жилы. Кръвны или кръвопосны  
жилы стоять всички-ты въ связь съ само-то  
срѣдце, и едни сѫ биющи, кои-то разносять  
кръвь-та изъ срѣдце-то по цѣло-то тѣло, а ед-